PR5002480_12_1402(b).pdf 1 10/03/14 12:14

140
10
10
175

Gamalate® B_6

Acción farmacológica
Gamalate B_6 por la acción de sus componentes activos: Aminoácidos cerebrotónicos (GABA y GABOB), sedante suave (BGM) y coenzima vitamina B_6, ejerce una acción energizante y neuroreguladora cerebral. Los aminoácidos y vitamina B_6 participan en el metabolismo cerebral y aumentan el potencial energético de la célula nerviosa. Mejora el rendimiento de las cualidades intelectuales.

Composición

	Cada 100 ml contiene
Bromhidrato del glutamato de magnesio	2 g
Acido γ-amino-butírico (GABA)	2 g
Acido γ-amino-β-hidroxi-butírico (GABOB)	1 g
Vitamina B_6	1 g
Excipientes	c.s.
	(contiene sacarina sódica)

Indicaciones
Adultos:
Coadyuvante en astenias funcionales:
– Inestabilidad emocional.
– Dificultad de concentración y memoria.
– Depresión y agotamiento nervioso.
– Disminución de la capacidad de adaptación.

Niños:
– Dificultad de concentración y disminución del rendimiento escolar.
– Inadaptación al medio social, familiar y escolar.

Posología
Adultos: 10 ml 2 ó 3 veces al día.

Niños hasta 2 años: 2,5 ml 3 veces al día.
de 2-4 años: 5 ml 3 veces al día.
de 4-7 años: 10 ml 2 veces al día.
mayores de 7 años: 10 ml 2 ó 3 veces al día.
Estas dosis pueden modificarse a criterio del médico.

Contraindicaciones y efectos secundarios
Alergia conocida a alguno de sus componentes. A las dosis máximas, puede producir ligeras molestias gástricas que desaparecen al ajustar la dosis.

Uso en el embarazo
Si el caso lo requiere, administrar bajo vigilancia médica.

Sobredosificación y su tratamiento
Dada la escasa toxicidad del preparado no se prevé que aparezcan síntomas de intoxicación.

Presentación
Frasco con 80 ml de solución.

No dejar a la vista y al alcance de los niños

Gamalate® B_6

Pharmacological action
Gamalate B_6 owing to the action of its active components: Cerebrotonic aminoacids (GABA and GABOB), mild sedative (MGH) and coenzyme Vitamin B_6, exerts an energizing and neuroregulator action on the brain. The aminoacids and vitamin B_6 take part in the cerebral metabolism and increase the energetic potential of the nervous cell. It improves the output of the intellectual qualities.

Composition

	Each 100 ml contains
Magnesium glutamate hydrobromide	2 g
γ-amino-butyric acid (GABA)	2 g
γ-amino-β-hydroxy-butyric acid (GABOB)	1 g
Vitamin B_6	1 g
Excipients	q.s.
	(contains sodium saccharin)

Indications
Adults:
Adjuvant in functional asthenias:
– Emotional instability.
– Concentration and memory difficulty.
– Depression and nervous breakdown.
– Decreased adaptation capacity.

Children:
– Concentration difficulty and decreased school output.
– Lack of adaptation to social, family and school milieu.

Dosage
Adults: 10 ml 2 or 3 times daily.

Children up to 2 years: 2.5 ml 3 times daily.
from 2 to 4: 5 ml 3 times daily.
from 4 to 7: 10 ml 2 times daily.
Over 7: 10 ml 2 or 3 times daily.
These doses can be modified as directed by physician.

Contraindications and side-effects
Known allergy to any of its components. At the maximum doses, it may produce slight gastric disorders which disappear on adjusting the dose.

Use during pregnancy
If required by the case, administer under medical vigilance.

Overdosage and its treatment
Given the scarce toxicity of the preparation, the appearance of symptoms of poisoning is not foreseen.

Supply
Bottle with 80 ml of solution.

Keep out of sight and reach of children

Gamalate® B_6

Action pharmacologique
Le Gamalate B_6 en raison de l'action de ses composants actifs: Acides aminés cérébrotoniques (GABA et GABOB), sédatif doux (BGM) et coenzyme vitamine B_6, exerce une action énergisante et neurorégulatrice cérébrale. Les acides aminés et la vitamine B_6 participent dans le métabolisme cérébral et augmentent le potentiel énergétique de la cellule nerveuse. Il améliore le rendement des qualités intellectuelles.

Composition

	Tous les 100 ml contiennent
Bromhydrate du glutamate de magnésium	2 g
Acide γ-amino-butyrique (GABA)	2 g
Acide γ-amino-β-hydroxy-butyrique (GABOB)	1 g
Vitamine B_6	1 g
Excipients	q.s
	(contient de la saccharine sodique)

Indications
Adultes:
Adjuvant dans les asthénies fonctionnelles:
– Instabilité émotionnelle.
– Difficulté de concentration et de mémoire.
– Dépression et épuisement nerveux.
– Diminution de la capacité d'adaptation.

Enfants:
– Difficulté de concentration et diminution du rendement scolaire.
– Inadaptation au milieu social, familial et scolaire.

Posologie
Adultes: 10 ml, 2 ou 3 fois par jour.

Enfants jusqu'à 2 ans: 2,5 ml, 3 fois par jour.
de 2 à 4 ans: 5 ml, 3 fois par jour.
de 4 à 7 ans: 10 ml, 2 fois par jour.
de plus de 7 ans: 10 ml, 2 ou 3 fois par jour.
Ces doses peuvent être modifiées selon le critère du médecin.

Contre-indications et effets secondaires
Allergie connue à n'importe quel de ses composants. Aux doses maximum, il peut produire de légers troubles gastriques qui disparaissent quand on ajuste la dose.

Utilisation pendant la grossesse
Si le cas le requiert, administrer sous surveillance médicale.

Surdosage et son traitement
Etant donné la rare toxicité de la préparation, on ne prévoit pas l'apparition de symptômes d'intoxication.

Présentation
Flacon avec 80 ml de solution.

Gardez hors de la vue et de la portée des enfants

Fabricado por/Manufactured by/Fabriqué par: **Ferrer Internacional, S.A.**
Gran Vía Carlos III, 94 Barcelona (España/Spain/Espagne) 5002480/12-1402

ferrer	**Escala** 1:1	**Código interno** 5002480	**Prospecto** Gamalate B_6 80 ml solución VT IFE	**Perfil** P175x140 SP
Oficina Técnica	**Material** Papel blanco satinado tipo lito 50 g/m²		**Dimensiones** 175x140 mm	**Plegado** Sin plegar
Aprobado:	**Referencia nº** 5002480/12-1402	**Anula a** 5002480/11-0710	**Motivo** Cambio titular a Ferrer	
Fecha:	**Tintas** ■ *Negro (100%)* ■ *Perfil*			

	Fecha 05/02/14	**Prueba** b	**Realización** Ferrer/4

FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94-98 Tel. 93 [illegible] 08028 - BARCELONA